

Le busard cendré

Le busard cendré est un rapace aux ailes longues et fines, chassant au-dessus des espaces ouverts. Il peut nicher dans des cultures, ce qui relie sa reproduction au calendrier des interventions agricoles.

Silhouette et plumages d'un chasseur des espaces ouverts

Le busard cendré est un rapace à ailes longues et fines, qui chasse bas au-dessus des espaces ouverts. Le mâle est largement gris, tandis que les femelles et les jeunes sont plus bruns. Les prairies et les cultures peuvent faire partie de son domaine de chasse et de reproduction.

Protéger les nichées avec les agriculteurs

Il niche au sol, parfois au milieu d'une parcelle cultivée. La protection des nichées demande alors une coopération entre naturalistes et agriculteurs. Un observateur peut contribuer en signalant une fréquentation répétée à un réseau compétent, sans entrer dans la parcelle ni annoncer publiquement un point de nid qui attire ensuite les curieux.

Un couvert favorable peut changer avant l'envol des jeunes

Une culture offre une structure où un oiseau peut s'installer, mais cette structure est ensuite modifiée par les travaux. Si les jeunes ne volent pas encore, l'évolution du couvert peut intervenir avant la fin de leur dépendance au site. Ce décalage explique l'importance d'anticiper avec les exploitants. Le diagnostic porte à la fois sur la présence du nid, le stade des jeunes et les opérations prévues.

Deux notions à connaître

Nichée - Ensemble des jeunes issus d'une même reproduction et élevés pendant une période commune, dont le suivi précise âge et stade de développement.

Envol des jeunes - Étape à laquelle de jeunes oiseaux deviennent capables de quitter le support par le vol, sans être nécessairement entièrement autonomes.

Rédaction FRT Guide, avec assistance IA. Les exemples expliquent des mécanismes ; ils ne constituent pas des observations réalisées sur un site précis.

Observer et mettre en pratique

Le busard cendré

Le repère essentiel

Les observations répétées ont de la valeur lorsqu'elles restent précises et discrètes. Elles peuvent soutenir une coopération concrète sans exposer publiquement les nichées.

Ma démarche en trois étapes

1. Notez les allers-retours répétés depuis une voie publique.
2. Comparez les ailes fines à celles du busard des roseaux.
3. Transmettez un soupçon de nidification à un réseau spécialisé.

Un exemple concret

Un busard revient régulièrement vers une même partie de culture. Ce trajet peut constituer un indice de reproduction, à transmettre discrètement à un réseau compétent. La protection éventuelle demande alors de comprendre ensemble le calendrier des oiseaux et celui des travaux agricoles, avec les personnes qui gèrent la parcelle.

La confusion à éviter

Un champ cultivé n'est pas automatiquement dépourvu de nidification. Des oiseaux peuvent utiliser cette végétation comme couvert au sol. La présence de cultures ne permet donc pas de conclure que les passages hors chemin sont sans effet.

Vérifier ma compréhension

Pourquoi une nichée peut-elle se trouver dans une culture ?

- A. Il construit toujours son nid dans les machines agricoles.
- B. Les jeunes sont transportés par les moissonneuses.
- C. Le busard cendré peut nicher au sol dans ces parcelles.

Correction : C. La nidification au sol explique l'intérêt des démarches concertées de protection.

Mon observation : lieu, date, indices et limites

.....

.....

.....

Sources et version en ligne

Parc naturel régional du Marais poitevin - Le busard cendré

<https://guide.rando-map.fr/mediatheque/public/faune-sauvage/article-le-busard-cendre>